

Szanowni Pacjenci!

Należy uważnie zapoznać się z niniejszą ulotką, ponieważ zawiera ona istotne informacje dotyczące stosowania wyrobu medycznego. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ulotka

isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa

Pastyłki do ssania

Co zawiera isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa?

Pastyłki zawierają wodny wyciąg z płucnicy Islandzkiej (0,4 – 0,8:1), karbomer, gumę ksantanową, hialuronian sodu.

Pozostałe składniki:

guma arabska, sorbitol, maltitol, bezwodny kwas cytrynowy, acesulfam K, olejek cytrynowy, olejek pomarańczowy, substancje aromatyzujące, ekstrakt z roślin barwiących (jabłko/szafran/cytrus), trójglicerydy średniołańcuchowe, woda oczyszczona.

1 pastylka zawiera zamienniki cukru: sorbitol (0,11 g) i maltitol (0,92 g) = 0,09 Jednostki chlebowej.

Kiedy stosować isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa?

- W celu złagodzenia najczęściej spotykanych dolegliwości związanych z przeziębieniem i bólem gardła, takich jak drapanie lub chrypka.

Przyczyną takich dolegliwości może być nieproduktywny, suchy kaszel – np. kaszel szczekający, wywołany przez podrażnioną i wysuszoną błonę śluzową.

Pastyłki isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa dzięki zawartości hydrożelowego kompleksu z kwasu hialuronowego i ziołowej płucnicy Islandzkiej efektywnie chronią błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Mechanizm działania

Pastyłki o przyjemnym miodowo-cytrusowym smaku zawierają hydrożelowy kompleks składający się z karbomeru i gumy ksantanowej wraz z kwasem hialuronowym. Dzięki zdolności wiązania wody polisacharydowej gumy ksantanowej oraz działaniu zwiększającego swoją objętość karbomeru, na podrażnionej śluzówce tworzy się ochronna błona. Dodatkowo, kwas hialuronowy zawarty w pastylkach tworzy na powierzchni błon śluzowych wilgotną powłokę.

Sucha pozostałość specjalnego wyciągu z płucnicy Islandzkiej, porostu rosnącego w surowym klimacie dalekiej Północy, składa się w ponad 80% z mucyn. Wyciąg ten uwalnia się podczas ssania pastylki i pokrywa okolice jamy ustnej i gardła, łagodząc podrażnienia.

Pobudza to wydzielanie śliny, dzięki czemu błona śluzowa ma możliwość zregenerowania się, a najczęstsze objawy towarzyszące przeziębieniu i podrażnieniom gardła np: drapanie w gardle i chrypka, suchość błony śluzowej oraz związany z nimi ból gardła i trudności w przełykaniu szybko ustępują.

Kiedy nie stosować isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa?

isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa nie może być stosowana w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik zawarty w pastylkach.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa?

W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, przed przyjęciem isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa należy skonsultować się z lekarzem.

Czy można stosować isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa podczas ciąży i karmienia piersią?

Brak danych przemawiających przeciwko stosowaniu isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa podczas ciąży i karmienia piersią.

Jak należy stosować isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa?

Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: do 6 pastylek dziennie w zależności od zapotrzebowania. Pastyłki należy ssać powoli aż do ich całkowitego rozpuszczenia.

1 pastylka zawiera 1,03 g zamienników cukru = 0,09 jednostki chlebowej.

Jak długo można stosować isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa?

isla[®] medic acute miodowo-cytrusowa może być stosowana przez dłuższy okres lub z przerwami.

Jeśli w ciągu 3 dni nie nastąpi poprawa lub objawy nasilą się (pojawi się gorączka lub bóle stawów), należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania isla® medic acute miodowo-cytrusowa?

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki, isla® medic acute miodowo-cytrusowa może wywołać działanie przeczyszczające i/lub dolegliwości brzuszne. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Data ważności została umieszczona na opakowaniu oraz na każdym blisterze. Nie stosować preparatu po upływie daty ważności. Pastylki należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C.

Zaleca się przechowywać blistry z pastylkami w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Jakie są dostępne wielkości opakowań?

Opakowania zawierają: 20 lub 50 pastylek.

Wytwórca

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden, Niemcy

Tel.: +49 6101 / 539 - 300

Fax: +49 6101 / 539 - 315

Internet: <http://www.engelhard.de>

E-mail: info@engelhard.de

Aktualizacja informacji

luty 2020



🔑 **Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci!**

Dodatkowe informacje:

Ze względu na proces wytwarzania, pastylki mogą zawierać pęcherzyki powietrza. Pozostałości pastylek mogą przywierać do folii. Powyższe niedogodności, jak również różnice w kolorze, smaku i konsystencji, związane z naturalnymi składnikami zawartymi w pastylkach, nie wpływają na jakość produktu.



ENGELHARD